





## GRILLE D'IDENTIFICATION

# REQUINS I

Nom commun	<b>AIGUILLAT</b>	<b>ÉMISOLE TACHETÉE</b>	<b>REQUIN HÂ</b>	<b>GRANDE ROUSSETTE</b>	<b>PETITE ROUSSETTE</b>		
Nom scientifique	<i>Squalus acanthias</i>	<i>Mustelus asterias</i>	<i>Galeorhinus galeus</i>	<i>Scyliorhinus stellaris</i>	<i>Scyliorhinus canicula</i>		
Noms locaux	Chien de mer, Chien à dard, Chien piquet	Emissole, Motelle, Moutelle, Virli	Hâ, Chien de mer	Biche, Bichon (jeune)	Roussette, Chien-bro, Holbiche		
Code FAO	<b>DGS</b>	<b>SDS</b>	<b>GAG</b>	<b>SYT</b>	<b>SYC</b>		
Taille / Poids mini capture	<b>500 g</b>	<b>100 cm (Maxi)</b>	Aucune	Aucune	<b>500 g</b>		
Taille / Poids communs	80-120 cm 150 cm (max)	100-130 cm 140 cm (max)	100-150 cm 200 cm (max)	80-120 cm 170 cm (max)	50-70 cm 100 cm (max)		
Photo							
	<b>NE PAS CONFONDRE</b>		<b>PÊCHE INTERDITE A LA PALANGRE</b>	<b>NE PAS CONFONDRE</b>			
Caractères distinctifs	<p><b>Forte épine devant chaque dorsale.</b></p> <p><b>Absence de nageoire anale.</b></p>  	<p>2<sup>ème</sup> dorsale plus développée que l'anale.</p>	<p><b>Nombreux points blancs</b> sur le dos (absents pour 20 à 30% des individus).</p> 	<p>2<sup>ème</sup> dorsale et l'anale de taille quasi identique et symétrique.</p> 	<p><b>Lobe inférieur de la caudale développée.</b></p> <p>Dos marqué par de <b>nombreuses grosses taches foncées.</b></p>  	<p>Les valvules nasales n'atteignent pas la bouche et sont bien séparées.</p>	<p>Dos marqué par de très <b>nombreuses petites taches foncées.</b></p> <p>Les valvules nasales atteignent la bouche et se rejoignent.</p>  

Credit photos : NFM, SMEL, IFREMER, CRPM-BN / Source textes : Les poissons de mer des pêches françaises - JC. Quéro, JJ. Vayne - IFREMER

## GRILLE D'IDENTIFICATION

## REQUINS N°2

PÊCHE NON RECOMMANDÉE		PÊCHE INTERDITE			
Nom commun	PEAU BLEUE	REQUIN RENARD	ANGE DE MER	REQUIN-TAUPE	REQUIN PÉLERIN
Nom scientifique	<i>Prionace glauca</i>	<i>Alopias vulpinus</i>	<i>Squatina squatina</i>	<i>Lamna nasus</i>	<i>Cetorhinus maximus</i>
Noms locaux		Renard de(s) mer(s), Requin faux, Faux	Moine	Veau de mer, Touille, Marache	
Code FAO	<b>BSH</b>	<b>ALV</b>	<b>AGN</b>	<b>POR</b>	<b>BSK</b>
Taille commune	4 m (max)	6 m (max)	140 - 170 cm 2.5 m (max)	90 - 260 cm 3-4 m (max)	15 m (max)
Photo					
Caractères distinctifs	<b>NE PAS CONFONDRE</b>		<b>Pas de confusion</b>		<b>NE PAS CONFONDRE</b>
	<b>Nageoires pectorales longues et étroites (supérieures à la tête).</b>  Dos bleu foncé.	<b>Museau court.</b>  <b>Nageoire caudale égale ou supérieure à la longueur du corps.</b>	<b>Corps aplati, tête large.</b>  <b>Nageoires pectorales très développées.</b>	<b>Corps trapu.</b>  <b>Queue en forme de croissant (quasi symétrique).</b>  <b>Tache blanche à l'arrière de la 1ère nageoire dorsale.</b>	<b>Museau conique.</b>  <b>Petits yeux.</b>  <b>Fentes branchiales marquées autour de la tête.</b>

Credit photos : NFM, IFREMER / Source textes : Les poissons de mer des pêches françaises - JC. Quéro, JJ. Vayne - delachaux et niestlé - Ifremer

Grille disponible auprès de Normandie Fraîcheur Mer

10, avenue du général De Gaulle, BP 27 14520 Port-en-Bessin -tél : 02 31 51 21 53 / fax : 02 31 51 21 52 - mail : secretariat@nfm.fr -www.nfm.fr

Grille d'identification-REQUINS 2\_VI

## GRILLE D'IDENTIFICATION

# RAIES

Nom commun	RAIE BOUCLÉE	RAIE BRUNETTE	RAIE FLEURIE	RAIE MÊLÉE	RAIE DOUCE	RAIE LISSE
Nom scientifique	<i>Raja clavata</i>	<i>Raja undulata</i>	<i>Leucoraja naevus</i>	<i>Raja microocellata</i>	<i>Raja montagui</i>	<i>Raja brachyura</i>
Noms locaux	Raie grise	Raie fleurie, raie fleur	Raie lune, raie japonaise	Raie terre, raie verte	Raie blanche	Raie blanche
Code FAO	<b>RJC</b>	<b>RJU</b>	<b>RJN</b>	<b>RJE</b>	<b>RJM</b>	<b>RJH</b>
Taille mini capture	<b>45 cm</b>	<b>78 cm</b>	<b>45 cm</b>	<b>45 cm</b>	<b>45 cm</b>	<b>45 cm</b>
Taille / Poids communs	115 cm / 10-12 kg	100 cm / 6-7 kg	72 cm / 5-6 kg	90 cm / 6-7 kg	80 cm / 5-6 kg	125 cm / 15-20 kg
Photo						
<b>NE PAS CONFONDRE</b>						
Caractères distinctifs	<b>Taches sombres</b> et claires sur la queue et présence de <b>grosses épines</b> recourbées sur le dos et le ventre.	Dos constituée de <b>bandes sombres</b> plus ou moins ondulées et de <b>taches blanches</b> .	Présence sur chaque aile d'une <b>tache arrondie</b> dont le centre et le tour sont de couleur différente (noir/jaune).	<b>Lignes claires</b> plus ou moins parallèles aux bords des ailes.	Nombreux <b>points noirs</b> (plus ou moins gros) <b>n'atteignant pas le bord des ailes</b> .	Dos entièrement recouvert de nombreux <b>points noirs</b> (plus ou moins petits) <b>jusqu'au bord des ailes</b> .

Source textes : Les poissons de mer des pêches françaises - JC. Quéro, JJ. Vayne – IFREMER / Crédit photos : NFM, SMEL, IFREMER, CRPM-BN

Grille disponible auprès de Normandie Fraîcheur Mer

10, avenue du général De Gaulle, BP 27 14520 Port-en-Bessin -tél : 02 31 51 21 53 / fax : 02 31 51 21 52 - mail : [secretariat@nfm.fr](mailto:secretariat@nfm.fr) – [www.nfm.fr](http://www.nfm.fr)

Grille d'identification-RAIES\_V3